

インプラント治療フローチャート

[前編] 初診～治療準備完了

詳しい検査と的確な予備治療が治療のカギを握ります。治療計画についての
ていねいな説明を受けじっくり検討しましょう！

準備完了！
インプラントの
埋入へ

インプラント 埋入前の 予備治療

お口のクリーニングと歯みがきのスキルアップ指導を受けていただき、お口の清潔を保ちます。また、インプラント埋入前に必要な治療を行います。

- むし歯の治療
- 歯周病の治療
- 矯正治療
- 再生療法
(骨を増やす治療)
- 上顎洞底挙上術など

治療期間／
治療内容により異なります。

診断と説明

検査結果と診断の説明

予備治療、手術の回数、使用する材料、治療期間などの説明と、治療計画の提案をします。

費用の見積もり

相談のうえ治療法を
選択し決定します。

治療期間／納得できるまで
じっくり検討します。

*決断できない場合は、
セカンドオピニオンという
選択肢も。

相談と検査

お口のお悩み相談


- 問診
- 視診と触診
- レントゲン検査
- CT検査
- お口の型取り
- 口腔内写真撮影
- からだの健康状態の確認

治療期間／受診2回程度




再生療法 (GBR)

骨を増やす治療をして、3～6ヵ月ほど骨が定着し安定するのを待ちます。



矯正治療

インプラントを噛み合わせよく埋入するために、歯並びを整えます。



歯周病を フラップ手術で治療

初期治療で治らない場合は歯ぐきを切開して徹底的にプラークを除去します。



歯周病の初期治療

スクレーピングで歯周ポケットのなかのプラークと歯石を除去し炎症を止めます。



インプラント治療フローチャート

[後編] 埋入～治療終了


治療箇所はできるだけ安静に。治療終了後は定期的にメンテナンスに通ってよい状態を長く保ちましょう！

「2
回
法」

治療終了！

上部構造の装着


- 定期的メンテナンスへ



上部構造づくり

仮歯をつけ上部構造を製作します。

- 仮歯の修正
- 噛み合わせ調整
- 試適




治療期間／奥歯1～3ヵ月
前歯3～6ヵ月

頭出し手術

歯ぐきを切開してアバットメントをつけ、歯ぐきの治癒を待ちます。

- (二次手術)




治療期間／2～4ヵ月

インプラントの埋入

インプラントを埋入します。感染を防いでそっとしておくために、歯ぐきを閉じて骨との結合を待ちます。

- (一次手術)



治療期間／
おおむね1～4ヵ月

「1
回
法」

治療終了！

上部構造の装着


- 定期的メンテナンスへ



上部構造づくり

仮歯をつけ上部構造を製作します。


- 仮歯の修正
- 噛み合わせ調整
- 試適



治療期間／奥歯1～3ヵ月
前歯3～6ヵ月

インプラントの埋入

インプラントを埋入します。それと同時にアバットメントをつけ、骨との結合を待ちます。
(二次手術をはぶきます)



治療期間／
おおむね1～4ヵ月



1


インプラント治療には、一次手術+二次手術と2回の手術を行う「2回法」と、1回の手術ですませる「1回法」があります。

2回法は、インプラントを埋入後にいったん歯ぐきを閉じてインプラント体とあごの骨の結合を待ち、その後2度目の手術をしてインプラントの頭を出し、アバットメントを取りつけます。それに対して、1回法はインプラ

ント埋入と同時にアバットメントをつける方法で、手術が一度ですみ、2回法にくらべて治療期間を短縮することができます。

適用症例が広いのは2回法で、より慎重に治療を進めたい場合に用いられます。前歯の審美治療、再生療法が必要、持病がある、タバコを吸うといったかたは、通常2回法が適用されます。1回法は、比較的条件のよいケースで選択されるのが一般的です。

再生療法 (GBR)



骨を増やす治療をインプラント埋入と同時に行い、2～4ヵ月ほど骨が定着し安定するのを待ちます。