


下がった歯ぐきが
気になるあなたに

歯の根を覆う「根面被覆」!

どんなふうに
根面を覆うの?


歯ぐきが下がってしまった歯。歯の根がのぞいて、どうしても見た目が気になる。そんなときに
お役に立てるのが「根面被覆」。歯ぐきの組織をお口のなかの別の場所から移植する外科治療です。

露出した根面




右上の奥歯が舌側に傾いているせいで、
歯の根の先付近まで根面の象牙質が露出しています。

歯ぐきの切開




矢印のように歯ぐきを切開して……

移植組織の挿入




移植組織を歯ぐきのなかに挿入。




移植組織は主に
口蓋から採取します。

根面の被覆



切開した歯ぐきを移動させて、
移植した組織ごと根面を覆い、縫合します
(①と②の位置が対応しています)。

2週間後



術後の状態。露出していた根面が
厚い歯ぐきで覆われているのがわかるでしょうか。



歯ぐきを覆うと こんな変化が…

- 見た目の改善
この患者さんのようにかなり広く根面が見えているケースでも、治療によって審美性が格段に改善しています。
- 歯の抵抗性アップ
歯の根元に移植された組織が歯を覆い、刺激への抵抗性をもたらします。
- 知覚過敏の抑制
露出していた象牙質が覆われることで、知覚過敏が軽減することも。根面のむし歯(根面う蝕)の予防にも役立ちます。

監修：東京都・鈴木歯科医院院長 鈴木真名

根面被覆

治療の流れと治療前後のお約束

根面被覆の治療を受ける前と受けた後に注意していただきたいことをまとめました。

＼START／

まずは先生に相談

歯ぐきやあごの骨の状態が
根面被覆を行うのに
適しているか診断します。

根面被覆は部分的に下がった歯
ぐきが対象です。歯周病により
全体的に歯ぐきが下がっている
場合、根面被覆は適しません。



＼治療当日／

根面の清掃

露出した歯の根面から
プラークを除去します。



麻酔

歯ぐきを切開する部位や
移植組織を採取する部位に
局所麻酔をします。

歯ぐきの切開

どのように覆うかを
想定して、根面の
周りの歯ぐきを切開します。

移植組織の採取

口蓋の粘膜から
移植する組織を切り取ります。



治療後のご注意

- 術後、痛みが増すようでしたら、治療を受けた歯科医院に相談を。
- 炎症や感染を抑える薬を処方しますので、服用を続けてください。
- 血行がよくなると出血しやすくなります。
運動や飲酒は2～3日我慢。お風呂もシャワーで。
- 抜糸するまでの1～2週間は、治療したところでは噛まないように。
- 縫合した場所には、糸が取れるまでは歯ブラシをあてないように
しましょう。抜歯後2週間(当院での目安)は、毛のやわらかい歯
ブラシをやさしくあててください。



治療前のご注意

- 血液サラサラのお薬(抗血栓薬)など、
全身の病気のお薬を服用している場合はお伝えください。
自己判断での休薬は危険ですので絶対におやめください。
- 喫煙は手術の治りを悪くします。
手術の前後は、基本的にタバコはお控えください。
- 歯科から炎症を防ぐお薬や抗生剤を処方されているなら、
忘れずに服用を。

根面の被覆&縫合

切開した歯ぐきに
移植組織を挿入して
縫合します。

＼1～2週間後／

抜糸

傷がふさがったら
縫合した糸を抜きます。

＼GOAL／

経過観察へ

定期受診をお忘れなく!