


歯科治療の中断は お口のトラブルのもと


constantな受診が必要な治療もあります。
なるべく治療の中断はお控えください。
長期に来院できないことがわかっている場合は、早めにお申し出をお願いいたします。

歯の根の治療（仮のふたの装着後の中断）




歯の根の治療では、根の内部の細菌感染部分を除去したあと、洗浄した根の中に消毒薬を詰め、仮のふたをする工程があります。ここで中断してしまうと、仮のふたが劣化したり外れてしまい、細菌が内部に入り込んで、治療がやり直しになることがあります。

被せ物の治療（仮歯装着後の中断）




かぶ被せ物をつくる過程では、仮歯を装着し、しばらく様子を見ることがあります。ただ、その期間が長すぎると、仮歯が劣化したり外れたりして細菌が内部に入り、再びむし歯になることがあります。

抜歯の治療（抜歯後の中断）



抜歯したあとの隙間を長期間放置すると、支えを失った隣の歯が倒れてきたりすることがあります。

歯周病の治療（スケーリング*の途中で中断）



歯石を除去してお口の中の細菌を減らす治療を行いますが、途中で中断してしまうと、再び細菌が増えてくる可能性があります。

*スケーリング：菌に付着するプラークや歯石を、鋭利な刃のついた器具で除去する歯周病の治療の1つ。